

Côte d'Ivoire: Objectifs et Indicateurs du Sommet Mondial pour les Enfants

N°	Objectifs	Indicateurs	Niveau Géographique /Genre	Situation début de décennie 1988-1990	Situation mi-décennie 1994-1996	Situation fin décennie 1998-2000	Tendance	Objectif fin décennie	Ecart	Oservations
1	Entre 1990 et 2000, réduction d'un tiers la mortalité infantile et la mortalité des enfants de moins de cinq ans, ou réduction de celles-ci à 50 et 70 ‰ naissances vivantes respectivement, selon ce qui équivaudrait à la réduction la plus importante	<i>Quotient de mortalité des enfants de - 5 ans</i>	Ensemble	156 (RGPH-88)	150 (EDS-94)	171 (EDS-98/99)	+15,0	50	-122	La mortalité est en hausse sur la période
			Urbain	112 (RGPH-88)	120 (EDS-94)	125 (EDS-98/99)	+13,0			
			Rural	179 (RGPH-88)	165 (EDS-94)	197 (EDS-98/99)	+18,0			
		<i>Taux de mortalité infantile</i>	Ensemble	97 (RGPH-88)	91 (EDS-94)	112 (EDS-98/99)	+25,0	32	-80	
			Urbain	74 (RGPH-88)	75 (EDS-94)	85 (EDS-98/99)	+11,0			
			Rural	108 (RGPH-88)	100 (EDS-94)	124 (EDS-98/99)	+16,0			
			Garçons	101 (RGPH-88)	99 (EDS-94)	130 (EDS-98/99)	+29,0			
			Filles	85 (RGPH-88)	83 (EDS-94)	93 (EDS-98/99)	+8,0			
2	Entre 1990 et l'an 2000, réduire le taux de mortalité maternelle de moitié	<i>Taux de mortalité maternelle</i>	Ensemble		597 (EDS-94)	597 (EDS-94)	0	300	-297	Stabilité en de données fiables
3	Entre 1990 et l'an 2000, réduire de moitié la malnutrition grave et modérée chez les enfants de moins de cinq ans	<i>Prévalence de l'insuffisance pondérale</i>	Ensemble		23,8 (EDS-94)	21,2 (EDS-98/99)	-2,6	12	-9.2	La prévalence de l'insuffisance pondérale est en légère baisse Sauf chez les filles
			Urbain		16,2 (EDS-94)	13,3 (EDS-98/99)	-2,9			
			Rural		27,7 (EDS-94)	25,1 (EDS-98/99)	-2,6			
			Garçons		26,4 (EDS-94)	18,7 (EDS-98/99)	-7,7			
			Filles		21,1 (EDS-94)	23,6 (EDS-98/99)	+2,8			
		<i>Prévalence du retard de croissance</i>	Ensemble		24,4 (EDS-94)	25,4 (EDS-98/99)	-2,9	12	-13.2	
			Urbain		15,3 (EDS-94)	18,3 (EDS-98/99)	+3,0			
			Rural		29,2 (EDS-94)	28,6 (EDS-98/99)	-0,6			
			Garçons		25,2 (EDS-94)	23,8 (EDS-98/99)	-1,4			
			Filles		23,6 (EDS-94)	26,5 (EDS-98/99)	+2,9			
		<i>Prévalence de l'émancipation</i>	Ensemble		8,3 (EDS-94)	7,8 (EDS-98/99)	-0,5	4	-4	
			Urbain		7,9 (EDS-94)	6,4 (EDS-98/99)	-1,5			
			Rural		8,4 (EDS-94)	8,5 (EDS-98/99)	+2,9			
			Garçons		9,7 (EDS-94)	7,9 (EDS-98/99)	-1,8			
			Filles		6,7 (EDS-94)	7,6 (EDS-98/99)	+0,9			
4	Accès universel à l'eau à boire salubre	<i>Utilisation des sources améliorées de l'eau potable salubre</i>	Ensemble	63 (RGPH-88)	65,3 (MICS-96)	81,7 (MICS-2000)	+18,7	90	-8.3	Progrès mais les objectifs ne sont pas atteints
			Urbain	83,1 (RGPH-88)	83,1 (MICS-96)	88,8 (MICS-2000)	+5,7	90	-1.2	
			Rural	53,4 (RGPH-88)	60,9 (MICS-96)	74,2 (MICS-2000)	+20,8	90	-15.8	
5	Accès universel aux systèmes sanitaires d'évacuation des excréments	<i>Utilisation des moyens améliorés d'assainissement du traitement des excréments</i>	Ensemble	53,1 (RGPH-88)	58,5 (MICS-96)	59,1 (MICS-2000)	+6,0	90	-30.9	On note une baisse en milieu urbain
			Urbain	88,3 (RGPH-88)	94,4 (MICS-96)	80,2 (MICS-2000)	-8,1	90	-9.8	
			Rural	29,0 (RGPH-88)	34,3 (MICS-96)	36,8 (MICS-2000)	+7,8	90	-53.2	

Côte d'Ivoire: Objectifs et Indicateurs du Sommet Mondial pour les Enfants

N°	Objectifs	Indicateurs	Niveau Géographique /Genre	Situation début de décennie 1988-1990	Situation mi-décennie 1994-1996	Situation fin décennie 1998-2000	Tendance	Objectif fin décennie	Ecart	Oservations
6	Accès universel à l'éducation de base, achèvement du cycle d'enseignement primaire en sorte qu'au moins 90 % des enfants d'âge de fréquenter l'école primaire achèvent le cycle d'enseignement primaire, au terme d'un apprentissage de type classique ou non classique qui obéisse dans tous les cas à des normes comparables, l'accent étant mis sur la réduction de l'écart qui existe actuellement entre les filles et les garçons	<i>Enfants ayant atteint la classe de 5ème primaire</i>	Ensemble		64,3 (DPES 95-96)	69,2(DPES 96-97)	+4,9	80	-10.8	Léger progrès Sur la période 1995-2000
			Garçons		67,7 (DEPS 95-96)	72,9(DEPS 96-97)	+5,2	80	-7.1	
			Filles		61,9 (DEPS-95-96)	65,1(DEPS 96-97)	+3,2	80	-14.9	
			Urbain			72,9(MICS-2000)				
			Rural			66,4(MICS-2000)				
		<i>Taux net d'admission pour le niveau primaire</i>	Ensemble		24,0 (MICS-96)	23,1 (DEPS 97-98)	-0,9	90	-66.9	Baisse du taux d'inscription dans le primaire
			Garçons		27,7 (MICS-96)	25,5(DEPS 97-98)	-2,2	90	-64.5	
			Filles		22,3 (MICS-96)	20,5 (DEPS 97-98)	-1,8	90	-69.5	
		<i>taux net de fréquentation pour le niveau primaire</i>	Ensemble	50,0(MEN 89-90)	52,6 (MICS-96)	56,9(MICS-2000)	+4,3	90	-33.6	Léger progrès des indicateurs
			Urbain		63,7 (MICS-96)	66,5(MICS-2000)	+2,8	90	-23.5	
			Rural		42,9 (MICS-96)	48,5(MICS-2000)	+5,6	90	-41.5	
			Garçons		58,5 (MICS-96)	61,4(MICS-2000))	+2,9	90	-28.6	
			Filles		46,3 (MICS-96)	51,8(MICS-2000)	+5,5	90	-38.2	
7	Réduire le taux d'analphabétisme chez les adultes (15 ans ou plus) à la moitié au moins par rapport à celui de 1990, l'accent étant mis sur l'alphabétisation des femmes	<i>Taux d'alphabétisation</i>	Ensemble	35,2 (RGPH-88)	43,5 (MICS-96)	48,2 (MICS-2000)	+4,7	60	-11,8	Légère hausse du taux d'alphabétisation
			Urbain		61,1 (MICS-96)	62,8 (MICS-2000)	+1,7	60	+2,8	
			Rural		30,9 (MICS-96)	30,3 (MICS-2000)	-0,6	60	-29,7	
			Garçons	51,9 (RGPH-88)	56,9 (MICS-96)	60,1 (MICS-2000)	+3,2	60	-0,1	
			Filles	32,4 (RGPH-88)	32,3 (MICS-96)	38,2 (MICS-2000)	+5,9	60	-21,8	
8	Améliorer la protection des enfants vivant dans des circonstances particulièrement difficiles et s'attaquer aux sources qui ont causé ces situations	<i>Taux d'incapacité chez l'enfant</i>	Ensemble	-	-	1,3 (RGPH-98)				
			Urbain	-	-	1,4 (RGPH-98)				
			Rural	-	-	1,2 (RGPH-98)				

Côte d'Ivoire: Objectifs et Indicateurs du Sommet Mondial pour les Enfants

N°	Objectifs	Indicateurs	Niveau Géographique /Genre	Situation début de décennie 1988-1990	Situation mi-décennie 1994-1996	Situation fin décennie 1998-2000	Tendance	Objectif fin décennie	Ecart	Oservations
9	Accorder une attention particulière à la santé et à la nutrition des filles des femmes enceintes qui allaitent	Quotient de mortalité des enfants de moins de cinq ans	Ensemble	156 (RGPH-88)	150 (EDS-94)	171 (EDS-98/99)	+15,0	50	-122	La mortalité est en hausse sur la la période
			Urbain	112 (RGPH-88)	120 (EDS-94)	125 (EDS-98/99)	+12,0			
			Rural	179 (RGPH-88)	165 (EDS-94)	197 (EDS-98/99)	+18,0			
		Insufisance pondérale (Indice de Masse Corporelle inférieure à 18 kg/m2	Ensemble	-	7,9 (EDS-94)	8,2 (EDS-98/99)	-0,3			
			Urbain	-	5,6 (EDS-94)	6,4 (EDS-98/99)	-0,8			
			Rural	-	9,1 (EDS-94)	9,5 (EDS-98/99)	-0,4			
		Soins prénatals	Ensemble		83,2 (EDS-94)	84,4 (EDS-98/99)	+1,2	60	+24,4	
			Urbain		96,3 (EDS-94)	96,0 (EDS-98/99)	-0,3	60	+36	
			Rural		76,5 (EDS-94)	78,8 (EDS-98/99)	+2,3	60	-18,8	
		Prévalence du VIH	Ensemble	-	10 (PNLS)	9,5 (PNLS)				
			Urbain	-	-	13,0 (PNLS)				
			Rural	-	-	7,0 (PNLS)				
		Anémie ferriprive	Ensemble	-	-					
			Urbain	-	-					
			Rural	-	-					
10	Accès de tous les couples aux informations et aux services pour prévenir les grossesses prématurées, trop rapprochées, trop tardives ou trop nombreuses	Prévalence contraceptive	Ensemble		11,4 (EDS-94)	15,0 (EDS-98/99)	+3,6	30	-15	
			Urbain		19,3 (EDS-94)	24,2 (EDS-98/99)	+4,9	30	-5,8	
			Rural		6,9 (EDS-94)	10,2 (EDS-98/99)	+3,3	30	-19,8	
		Taux de fécondité des femmes de 15-49 ans	Ensemble	208 (RGPH-88)	198 (EDS-94)	176 (EDS-98/99)	-32			
			Urbain	168 (RGPH-88)	161 (EDS-94)	136 (EDS-98/99)	-32			
			Rural	237 (RGPH-88)	224 (EDS-94)	204 (EDS-98/99)	-33			
		Indice synthétique	Ensemble	6,8 (RGPH-88)	5,7 (EDS-94)	5,2 (EDS-98/99)	-1,6	4.5	-0,7	
			Urbain	5,1 (RGPH-88)	4,7 (EDS-94)	4,0 (EDS-98/99)	-1,1	4.5	+0,5	
			Rural	7,2 (RGPH-88)	6,4 (EDS-94)	6,0 (EDS-98/99)	-1,2	4.5	-1,5	
11	Accès de toutes les femmes enceintes aux soins prénatals, aux soins du personnel de santé formé lors de l'accouchement et aux services d'orientation en cas de grossesses à haut risque ou d'urgence obstétrique	Soins prénatals	Ensemble	-	83,2 (EDS-94)	87,5 (MICS-2000)	+4,3	80	+4,4	Objectif atteint mais légère baisse en milieu urbain
			Urbain	-	96,3 (EDS-94)	95,8 (MICS-2000)	-0,5	80	+16	
			Rural	-	76,5 (EDS-94)	81,3 (MICS-2000)	+4,8	80	-1,2	
		Soins à la naissance de l'enfant (assistance lors de l'accouchement)	Ensemble	-	45,4 (EDS-94)	62,7 (MICS-2000)	+17,3	60	+2,7	L'objectif en l'an 2000 est atteint
			Urbain	-	76,2 (EDS-94)	87,9 (MICS-2000)	+11,7	60	+27,9	
			Rural	-	35,0 (EDS-94)	43,2 (MICS-2000)	+8,2	60	+16,8	
			3/0							

Côte d'Ivoire: Objectifs et Indicateurs du Sommet Mondial pour les Enfants

N°	Objectifs	Indicateurs	Niveau Géographique /Genre	Situation début de décennie 1988-1990	Situation mi-décennie 1994-1996	Situation fin décennie 1998-2000	Tendance	Objectif fin décennie	Ecart	Oservations
12	Réduire le taux d'insuffisance pondérale à la naissance (moins de 2,5 kgs) à moins de 10 %	<i>Poids à la naissance inférieur à 2,5 kgs</i>	Ensemble	-	7,3 (EDS-94)	8,4 (EDS-98/99)	-1,1	10	-1,6	
			Urbain	-	9,4 (EDS-94)	13,5 (EDS-98/99)	-4,1	10	+3,5	
			Rural	-	6,2 (EDS-94)	6,1 (EDS-98/99)	+01	10	-3,9	
13	Réduire du tiers par rapport à 1990 la proportion de femmes souffrant d'anémie ferriprive	<i>Anémie ferriprive</i>	Ensemble	-	-					Pas de données
			Urbain	-	-					
			Rural	-	-					
14	Eliminer presque totalement les troubles dus aux carences en iode	<i>Consomation du sel iodé</i>	Ensemble	-	-	31,0 (MICS-2000)				
			Urbain	-	-	43,4 (MICS-2000)				
			Rural	-	-	20,1 (MICS-2000)				
		<i>Faible niveau en iode urinaire</i>	Ensemble	-	-	-				
			Urbain	-	-	-				
			Rural	-	-	-				
15	Eliminer presque totalement l'avitaminose A et ses effets, dont la cécité	<i>Enfants ayant reçu des suppléments en vitamine A</i>	Ensemble	-	-	15,6 (MICS-2000)				
			Urbain	-	-	12,8 (MICS-2000)				
			Rural	-	-	17,8 (MICS-2000)				
		<i>Mères ayant reçu des suppléments en vitamine A</i>	Ensemble	-	-	18,0 (MICS-2000)				
			Urbain	-	-	20,1 (MICS-2000)				
			Rural	-	-	16,3 (MICS-2000)				
		<i>Faible niveau de vitamine A</i>	Ensemble	-	-	-				
			Urbain	-	-	-				
			Rural	-	-	-				
16	Permettre à toutes les femmes de nourrir leurs enfants exclusivement au sein pendant quatre à six mois et de continuer à les allaiter tout en leur donnant des aliments d'appoint durant une bonne partie de la deuxième année	<i>Traitement d'allaitement exclusif</i>	Ensemble		3,0 (EDS-94)	11,4 (MICS-2000)	+8,4	100	-88,6	
			Urbain							
			Rural							
		<i>Taux de pratique d'allaitement et des aliments de compléments</i>	Ensemble		98,2 (EDS-94)	96,4 (EDS-98/99)	-1,8	100	-3,6	
			Urbain		94,7 (EDS-94)	94,7 (EDS-98/99)	0	100	-5,3	
			Rural		97,1 (EDS-94)	97,1 (EDS-98/99)	0	100	-2,9	
		<i>Taux d'allaitement continu</i>	Ensemble		75,3 (MICS-96)	86,7 (MICS-2000)	+11,4	100	-13,3	
			Urbain		62,7 (MICS-96)	80,9 (MICS-2000)	+18,2	100	-19,1	
			Rural		78,2 (MICS-96)	90,7 (MICS-2000)	+12,5	100	-9,3	

Côte d'Ivoire: Objectifs et Indicateurs du Sommet Mondial pour les Enfants

N°	Objectifs	Indicateurs	Niveau Géographique /Genre	Situation début de décennie 1988-1990	Situation mi-décennie 1994-1996	Situation fin décennie 1998-2000	Tendance	Objectif fin décennie	Ecart	Oservations
17	Institutionnaliser la promotion et la surveillance périodique de la croissance dans tous les pays d'ici à la fin des années 1990			-	-	-				Pas d'indicateurs
18	Faire connaître les moyens d'accroître la production alimentaire et fournir les services d'appui afin de garantir la sécurité alimentaire des ménages			-	-	-		-		- Pas d'indicateurs
19	Eliminer la poliomyélite dans le monde d'ici l'an 2000	<i>Nombre annuel de cas de polio</i>	Ensemble Urbain Rural				39 (Min Santé97)			Pas d'indicateurs
20	Eliminer le tétanos néonatal dans le monde d'ici à 1995	<i>Nombre annuel de cas de tétanos néonatal</i>	Ensemble Urbain Rural							
21	Réduire à 90 % la mortalité due à la rougeole par rapport aux niveaux de 1995 avant la vaccination, étape majeure sur la voie de l'éradication totale de la maladie à long terme	<i>Décès des enfants de moins de cinq ans à la rougeole</i> <i>Cas de rougeole chez les enfants de moins de 5 ans</i>	Ensemble Urbain Rural Ensemble Urbain Rural							

Côte d'Ivoire: Objectifs et Indicateurs du Sommet Mondial pour les Enfants

N°	Objectifs	Indicateurs	Niveau Géographique /Genre	Situation début de décennie 1988-1990	Situation mi-décennie 1994-1996	Situation fin décennie 1998-2000	Tendance	Objectif fin décennie	Ecart	Observations
22	Maintenir un taux élevé de vaccination (au moins de 90 %) d'enfants de moins d'1 an d'ici à l'an 2000) contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la poliomyélite, la tuberculose et, s'agissant des femmes en âge de reproduction, contre le tétanos	Couverture vaccinale Dtcq	Ensemble		51,4 (EDS-94)	61,9 (MICS-2000)	+10,5	90	-28,1	
			Urbain		71,3 (EDS-94)	75,4 (MICS-2000)	+4,1	90	-14,6	
			Rural		38,6 (EDS-94)	52,4 (MICS-2000)	+13,8	90	-37,6	
		Couverture vaccinale de rougeole	Ensemble		53,1 (EDS-94)	61,5 (EDS-98/99)	+8,4	90	-28,5	
			Urbain		65,7 (EDS-94)	70,0 (MICS-2000)	+15,7	90	-20,0	
			Rural		44,9 (EDS-94)	55,5 (MICS-2000)	+10,6	90	-34,5	
		Couverture vaccinale de polio	Ensemble		51,4 (EDS-94)	62,0 (MICS-2000)	+10,6	90	-28,0	
			Urbain		71,3 (EDS-94)	75,4 (MICS-2000)	+4,1	90	-14,6	
			Rural		38,6 (EDS-94)	52,6 (MICS-2000)	+14,0	90	-37,4	
		Couverture vaccinale de tuberculose (BCG)	Ensemble		73,8 (EDS-94)	84,4 (MICS-2000)	+10,6	90	-5,6	
			Urbain		90,9 (EDS-94)	92,6 (MICS-2000)	+1,7	90	+2,6	
			Rural		62,9 (EDS-94)	78,5 (MICS-2000)	+15,6	90	-11,5	
		Protection contre le tétanos néonatal	Ensemble		74,8 (EDS-94)	78,6 (MICS-2000)	+0,8	100	-24,5	
			Urbain		87,6 (EDS-94)	86,3 (MICS-2000)	-0,7	100	-13,1	
			Rural		68,3 (EDS-94)	72,8 (MICS-2000)	+4,5	100	-27,2	
23	Réduire de 50 % la mortalité due à la diarrhée chez les enfants âgés de moins de 5 ans et de 25 % l'incidence des diarrhées	Décès annuel d'enfants de moins de 5 ans dus à la diarrhée	Ensemble	-	-	-	-	-		Pas de données
			Urbain	-	-	-	-	-		
			Rural	-	-	-	-	-		
		Cas de diarrhée	Ensemble		20,6 (EDS-94)	20,1 (MICS-2000)	+0,5			
			Urbain		23,1 (EDS-94)	16,9 (MICS-2000)	+6,2			
			Rural		19,4 (EDS-94)	22,2 (MICS-2000)	-2,8			
		Utilisation du TRO	Ensemble		17,6 (EDS-94)	16,1 (MICS-2000)	+1,5			
			Urbain		24,4 (EDS-94)	25,8 (MICS-2000)	-1,4			
			Rural		13,5 (EDS-94)	10,6 (MICS-2000)	+2,9			
		Traitement de la diarrhée à la maison	Ensemble		76,1 (EDS-94)	70,0 (EDS-98/99)	+6,1			
			Urbain		68,0 (EDS-94)	60,2 (EDS-98/99)	+7,8			
			Rural		81,1 (EDS-94)	74,5 (EDS-98/99)	+6,6			
24	Réduire d'un tiers la mortalité due aux infections respiratoires aiguës chez les enfants de moins de 5 ans	Décès des enfants de moins de 5 ans dus aux infections respiratoires aiguës (IRA)	Ensemble	-	-	-				
			Urbain	-	-	-				
			Rural	-	-	-				
		Recherche de soins pour traiter les IRA	Ensemble		38,6 (EDS-94)	34,9 (EDS-98/99)	-3,7	13	-21,9	
			Urbain		53,8 (EDS-94)	51,0 (EDS-98/99)	-2,8	13	-38,0	
			Rural		29,1 (EDS-94)	28,1 (EDS-98/99)	-1	13	-15,0	
25	Éliminer la maladie causée par le ver de Guinée (dracunculose) d'ici à	Cas de dracunculose	Ensemble	12600		302				
			Urbain							

Côte d'Ivoire: Objectifs et Indicateurs du Sommet Mondial pour les Enfants

N°	Objectifs	Indicateurs	Niveau Géographique /Genre	Situation début de décennie 1988-1990	Situation mi-décennie 1994-1996	Situation fin décennie 1998-2000	Tendance	Objectif fin décennie	Ecart	Oservations
	l'an 2000		Rural							
26	Elargir les activités de développement du jeune enfant, notamment interventions appropriées peu coûteuses entreprises à l'échelon de la famille et de la collectivité	<i>Développement préscolaire</i>	Ensemble	0,91 (DPES 1990)	2,0 (DPES 1995)	6,2 (MICS-2000)				
			Urbain			12,6 (MICS-2000)				
			Rural			1,4 (MICS-2000)				
			Garçons	0,93 (DPES 1990)	2,1 (DPES 1990)	6,8 (MICS-2000)				
			Filles	0,90 (DPES 1990)	2,0 (DPES 1990)	5,7 (MICS-2000)				
		<i>Prévalence de l'insuffisance pondérale</i>	Ensemble							Cf. objectif 3
			Urbain							
			Rural							
27	Permettre aux individus et aux familles d'acquérir davantage de connaissances et de compétences ainsi que des valeurs nécessaires pour améliorer leurs conditions de vie, en recourant à tous les moyens d'éducation, y compris les médias, et les autres formes modernes et traditionnelles de communication et d'action sociale, l'efficacité étant mesurée à l'évolution des comportements									Pas d'indicateurs

Côte d'Ivoire: Objectifs et Indicateurs du Sommet Mondial pour les Enfants

N°	Objectifs	Indicateurs	Niveau Géographique /Genre	Situation début de décennie 1988-1990	Situation mi-décennie 1994-1996	Situation fin décennie 1998-2000	Tendance	Objectif fin décennie	Ecart	Oservations
----	-----------	-------------	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------	-----------------------	-------	-------------

		Enregistrement des naissances	Ensemble			71,8 (MICS-2000)				
			Urbain			87,8 (MICS-2000)				
			Rural			59,9 (MICS-2000)				
		Arrangements concernant la résidence des enfants	Ensemble							
			Urbain							
			Rural							
		Orphelins dans les ménages	Ensemble		4,0 (EDS- 94)	7,4 (MICS-2000)				
			Urbain			7,9 (MICS-2000)				
			Rural			7,0 (MICS-2000)				
		Travail des enfants	Ensemble	10,4 (RGPH-88)		14,3 (RGPH-98)				
			Urbain							
			Rural							
		Traitement des maladies à domicile	Ensemble							
			Urbain							
			Rural							
		Connaissance des soins à chercher	Ensemble			52,7 (MICS-2000)				
			Urbain			51,3 (MICS-2000)				
			Rural			53,7 (MICS-2000)				
		Moustiquaires	Ensemble			9,6 (MICS-2000)				
			Urbain			11,9 (MICS-2000)				
			Rural			7,8 (MICS-2000)				
		Traitement du paludisme	Ensemble			57,5 (MICS-2000)				
			Urbain			68,6 (MICS-2000)				
			Rural			49,8 (MICS-2000)				
		Connaissance de la prévention du VIH/SIDA	Ensemble			35,0 (MICS-2000)				
			Urbain			42,6 (MICS-2000)				
			Rural			24,9 (MICS-2000)				
		Connaissance des conceptions erronées du VIH/SIDA	Ensemble			17,5 (MICS-2000)				
			Urbain			24,5 (MICS-2000)				
			Rural			8,2 (MICS-2000)				
		Connaissance de la transmission du VIH de la mère à l'enfant	Ensemble			39,8 (MICS-2000)				
			Urbain			41,0 (MICS-2000)				
			Rural			38,3 (MICS-2000)				
		Attitude vis à vis des personnes ayant le VIH/SIDA	Ensemble			41,5 (MICS-2000)				
			Urbain			50,8 (MICS-2000)				
			Rural			29,0 (MICS-2000)				

Côte d'Ivoire: Objectifs et Indicateurs du Sommet Mondial pour les Enfants

N°	Objectifs	Indicateurs	Niveau Géographique /Genre	Situation début de décennie 1988-1990	Situation mi-décennie 1994-1996	Situation fin décennie 1998-2000	Tendance	Objectif fin décennie	Ecart	Oservations
----	-----------	-------------	----------------------------------	--	---------------------------------------	--	----------	-----------------------------	-------	-------------

		Femmes qui connaissent <i>un endroit où elles peuvent aller faire un test du VIH</i> Femmes qui ont été testées <i>pour le VIH</i>	Ensemble			19,0 (MICS-2000)				
			Urbain			27,3 (MICS-2000)				
			Rural			7,9 (MICS-2000)				
			Ensemble			7,2 (MICS-2000)				
			Urbain			10,3 (MICS-2000)				
			Rural			3,1 (MICS-2000)				

EDS: Enquête Démographique et de Santé

RGPH: Recensement Général de la Population et de l'Habitation

DEPS: Direction de la Planification de l'Evaluation et des Statistiques

MICS: Enquête à Indicateurs Multiples

ENV: Enquête National sur le Niveau de Vie

MEN: Ministère de l'Education Nationale

PNLS: Programme National de Lutte contre le SIDA